

 **ЧЕСТНАЯ
ДЕЗИНСЕКЦИЯ**



Инструкция по применению
инсектицидного средства

Ацетрин Супер

Общие сведения о препарате Ацетрин Супер

Средство инсектицидное Ацетрин Супер – это концентрат эмульсии в виде густой жидкости от темно-желтого до светло-коричневого цвета. Содержит в качестве действующего вещества (ДВ) ацетамиприд (10%) из группы неоникотиноидов и пиретроид эсбиотрин (5%). В состав данного средства также входят синергисты ППБ (5%) и МОК 264 (дикарбоксимид) (5%), различные эмульгаторы, стабилизаторы, ПАВ и растворитель.

Препарат дезинсекции Ацетрин Супер обладает высоким острым инсектицидным действием в отношении тараканов и клопов и остаточным действием в зависимости от вида насекомого, его численности и типа обрабатываемой поверхности.

По параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных, при воздействии на кожные покровы к 4 классу мало опасных средств по ГОСТ 12.1.007-76. По степени летучести средство уничтожения насекомых Ацетрин Супер относится ко 2 классу опасности по Классификации химических веществ по степени летучести. При однократном контакте с кожей установлено слабое раздражающее действие. При воздействии на слизистые оболочки глаз вызывает умеренное раздражающее действие. Сенсibiliзирующее действие не установлено.

Рабочая эмульсия не обладает кожно-резорбтивным эффектом. При ингаляционном воздействии по зоне острого биоцидного эффекта в режиме орошения (аэрозоль + пары) и при обработке поверхностей кистью (пары) относится к 3 классу умеренно опасных средств по Классификации степени опасности средств дезинсекции.

ОБУВ ацетамиприда в воздухе рабочей зоны 0,2 мг/м³;

ПДК в воздухе рабочей зоны d-аллетрина 1 мг/м³ (пары+аэрозоль, 2 класс опасности).

Средство Ацетрин Супер предназначено для уничтожения тараканов, клопов (в том числе тропических), муравьев на объектах различных категорий: в производственных и жилых помещениях, в образовательных, административных, в медицинских, в том числе детских организациях (кроме спален и игровых комнат), социального обеспечения, коммунально-бытового назначения (гостиницы, отели, хостелы, общежития, спорткомплексы, бассейны, фитнес залы), на предприятиях общественного питания, специалистами организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью, и населением в быту.



Приготовление рабочих эмульсий и нормы расхода препарата Ацетрин Супер

Для уничтожения насекомых используют свежеприготовленные водные эмульсии путем разведения 15% концентрата Ацетрин Супер в воде. Для приготовления рабочих эмульсий средство Ацетрин Супер разводят водой комнатной температуры, равномерно перемешивая. Расчет количества средства, необходимого для приготовления рабочих эмульсий, приведен в таблице.

Количество средства Ацетрин Супер, необходимое для приготовления рабочих эмульсий

Вид насекомого	Концентрация (%) по ДВ	Концентрация (%) рабочей эмульсии по препаративной форме	Количество средства (г) на литр воды		
			1	10	50
Тараканы	0,075	0,5	5	50	500
Муравьи	0,075	0,5	5	50	500
Клопы постельные	0,150	1,0	10	100	1000
Клопы тропические	0,225	1,5	15	150	1500

При работе с рабочими водными эмульсиями используют распыливающую аппаратуру различных марок типа Квазар, а также установки на автотранспорте; возможно использование генераторов холодного тумана.

Убирают средство Ацетрин Супер с обработанных поверхностей влажным способом - ветошью мыльно-содовым раствором через 24 часа после применения, но не позднее, чем за 3 часа до начала рабочего дня. Из других мест после потери его эффективности.



Уничтожение тараканов препаратом Ацетрин Супер

Для уничтожения тараканов используют 0,075% по ДВ рабочие водные эмульсии Ацетрин Супер (5 мл на 1 л), которыми обрабатывают места скопления, возможного обитания или передвижения тараканов. Особое внимание уделяют отверстиям и щелям в стенах, в дверных коробках, порогах, вдоль плинтусов, в облицовочных покрытиях, а также вентиляционным отдушинам и стыкам труб водопроводной, отопительной и канализационных систем.

При обработке поверхностей, впитывающих влагу (дерево, неокрашенная фанера), расход рабочей водной эмульсии может быть увеличен до 100 мл/м². Обработку препаратом Ацетрин Супер проводят одновременно во всех помещениях, заселенных тараканами. При высокой и очень высокой численности обрабатывают смежные помещения в целях профилактики: для предотвращения миграции и последующего заселения их тараканами. Повторные обработки средством Ацетрин Супер проводят при появлении тараканов.



Ацетрин Супер для борьбы с постельными клопами

Для уничтожения клопов используют 0,15% (по ДВ) рабочие водные эмульсии или 10 мл концентрата Ацетрин Супер на 1 л воды. При незначительной заселенности помещений постельными клопами обрабатывают места их обитания; при большой заселенности и в случае облицовки стен сухой штукатуркой обработке подлежат также места их возможного расселения: щели вдоль плинтусов, бордюров, места отставания обоев, вокруг дверных, оконных рам и вентиляционных решеток, щели в стенах, мебели, деревянные стыки кроватей, а также ковры с обратной стороны.

При наличии в помещениях тропических клопов концентрацию рабочей эмульсии Ацетрин Супер увеличивают до 0,225% (15 мл концентрата на 1 л воды).

Постельные принадлежности обрабатывать не рекомендуется!

В общежитиях, казармах, воинских частях, интернатах, детских оздоровительных лагерях и там, где возможен частый занос насекомых, проводят одновременную обработку препаратом Ацетрин Супер всех помещений, расходуя рабочий раствор не менее 100 мл/м² обрабатываемой поверхности.

Повторные обработки проводят при обнаружении клопов.



Уничтожение муравьев средством Ацетрин Супер

Для уничтожения рыжих домовых муравьев препаратом дезинсекции Ацетрин Супер обрабатывают пути передвижения («дорожки») или места их скопления: душевые, санузлы, ванные комнаты. Используют рабочие водные эмульсии 0,075% (по ДВ) концентрации (5 мл концентрата на 1 л воды).

Для уничтожения садовых муравьев средством Ацетрин Супер обрабатывают отмостки домов, фундамент, пороги крыльца или террасы, т.е. пути проникновения насекомых в помещения. Расход эмульсии можно увеличить до 15 мл концентрата на 1 л воды.

Обработки повторяют при появлении муравьев.



Меры предосторожности при работе с препаратом Ацетрин Супер

Обработку помещений от насекомых средством дезинсекции Ацетрин Супер следует проводить при закрытых дверях, окнах, форточках в отсутствие людей, домашних животных, птиц, рыб, при открытых окнах. Продукты и посуду перед обработкой следует удалить или тщательно укрыть, мебель также тщательно укрыть. При обработке препаратом Ацетрин Супер цехов промышленных предприятий предварительно убрать и тщательно укрыть продукцию, которая может адсорбировать средство. После проведения дезинсекции помещение следует хорошо проветрить не менее 30 минут и провести влажную уборку с использованием мыльно-содового раствора. В детских учреждениях обработку следует проводить (кроме спален и игровых комнат) только в отсутствие детей в санитарные или выходные дни, предварительно вынести все игрушки из помещений.

Помещениями, обработанными средством, нельзя пользоваться до их уборки, которую проводят на позднее, чем за 1-2 часа до использования объекта по назначению. Уборку проводят во влагонепроницаемых перчатках, используя содовый раствор (30-50 г кальцинированной соды на 1 л воды). Помещение убирают при открытых окнах и форточках.

Работающие со средством Ацетрин Супер должны соблюдать следующие меры предосторожности: перед началом работы со средством дезинструктор проводит инструктаж по технике безопасности и мерам оказания первой помощи. Лица, проводящие дезинсекцию, расфасовку средства, приготовление эмульсий, должны пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Индивидуальные защитные средства включают: халат или комбинезон хлопчатобумажный, косынку, перчатки влагонепроницаемые или рукавицы хлопчатобумажные с пленочным покрытием, герметические очки, универсальные респираторы «РУ-60М», «РПГ-67» с патроном марки «А».

После окончания работ спецодежду следует вытряхнуть вне помещения и выстирать. Стирают ее по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю, предварительно замочив (для обезвреживания загрязнений) в горячем мыльно-содовом растворе на 2-3 часа (50 г кальцинированной соды и 27 г мыла на 1 ведро воды), затем выстирать в свежем мыльно-содовом растворе.

При работе со средством Ацетрин Супер обязательно соблюдать правила личной гигиены. После окончания работы со средством необходимо прополоскать рот, вымыть руки и лицо водой с мылом.



Первая помощь при отравлении средством Ацетрин Супер

При отравлении через дыхательные пути вывести пострадавшего из помещения на свежий воздух, снять загрязненную одежду.

При случайном попадании средства Ацетрин Супер в глаза - тщательно промыть их под струей воды в течение нескольких минут. При появлении раздражения слизистой оболочки - закапать за веко 20% сульфацил натрия.

При загрязнении кожи - снять капли эмульсии Ацетрин Супер ватным тампоном или ветошью, не втирая, затем вымыть загрязненный участок водой с мылом.

При случайном попадании средства Ацетрин Супер в желудок - необходимо выпить 1-2 стакана воды с адсорбентом (10-15 таблеток активированного угля на стакан воды).



Транспортирование, хранение, упаковка Ацетрин Супер

Транспортирование допускается всеми видами наземного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующим сохранность средства и тары.

Хранить средство Ацетрин Супер следует в сухом, закрытом, темном, прохладном складском помещении в закрытой упаковке, при температуре не ниже минус 10°C и не выше плюс 40°C, вдали от источников огня и солнечного света, отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов, в не доступных для детей местах. В аварийной ситуации - при утечке большого количества средства Ацетрин Супер – необходимо засыпать его сорбирующим материалом (песок, земля, опилки, кизельгур), затем собрать в специальную емкость для последующей утилизации, а загрязненный участок обработать кашицей хлорной извести (1 кг на 10 л воды), используя средства индивидуальной защиты, после чего вымыть водой.

Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные (поверхностные) или подземные воды и канализацию.

Упаковывается средство в канистры полиэтиленовые по 5; 10 и 20 л; во флаконы с дозатором емкостью 0,1; 0,5 и 1,0 л.

Срок годности препарата Ацетрин Супер не менее 5 лет в невскрытой упаковке изготовителя.

